


TAVOLA DI CORRELAZIONE TRA LE SEZIONI STRATIGRAFICHE DELL'AREA SETTENTRIONALE



LEGENDA

- 100m
 - 80
 - 60
 - 40
 - 20
 - 0
- | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| | Maioiica | | Calcarei nodulari s.l. |
| | Calcarei granulari con diaspri | | Calcarei nodulari nocciola |
| | Calcarei a Posidonia | | Calcarei nodulari con marne verdi |
| | Rosso ammonitico | | Calcarei stratificati grigi |
| | Unità marnoso-calcareo del Sentino | | Calcare massiccio "B" |
| | Corniola | | Calcare massiccio "A" |
| | Calcare massiccio "C" | | Lacuna |
| | Calcarei nodulari ad optici | | Hialus |
| | Filoni sedimentari | | Correlazione fra la zona a «resti organici spazzati» e il corrispondente intervallo nelle serie complete |

TITONICO		ETA'
IN F.	SUP.	
OXFORDIANO - KIMMERIDGIANO		M A L M
CALLO - VIANO		M A L M
AALENIANO - BATHONIANO		DOGGER
TOARCIANO		
PLIENSACHIANO - DOMERIANO		S
SINEMURIANO SUP. (LOTHARINGIANO)		A
HETTANGIANO pp. SINEMURIANO INF.		I

EREMO DEL M. CUCCO